

Observation sur l'opération d'un
anévrisme faux produit par une saignée
faite depuis 35 jours par laquelle on voit
qu'il n'est pas impossible de se rendre maître
du sang de l'artere brachiale avec une seule
ligature.

Le 9. d'août 1728. M^{lle} Saurin femme d'un capitaine
de Barque pour le corail, me fit voir son fils
âgé de 13 ans foible constitution, qui avoit au pli
du bras gauche une tumeur grosse et longue comme
une bonne mayenne, rouge, et sans douleur, mole,
inegale, avec bruit et un battement peu sensible
au tact, l'avant bras étoit fléchi sans pouvoir
s'étendre, parceque cette elevation prenoit naissance
au dessous de la partie moyenne inférieure du
muscle biceps, de son tendon, de son aponevrose, et
entre les autres muscles voisins, la mere de cet
enfant me dit que cette tumeur étoit survenue
depuis 17 jours petit à petit à la suite d'une
saignée qui parut avoir été faite à la mediane
environ d'un pouce au dessous du pli du coude,
qu'on avoit eu beaucoup de peine d'arrêter le sang
par le bandage, et la compression, et que l'ouverture
extérieure s'étoit réunie quelques jours après;
Je compris alors que le malade avoit un anévrisme
faux; Je conseillay de le faire operer au plus tôt, et
je n'en eus plus de nouvelle que le 27 du même mois
qu'on m'envoya prendre sur les 9 heures du soir de

ARC 54
n° 38



S. Loup le croix de Marseille, pour luy couper le bras,
deux maîtres chirurgiens du lieu qui commençoient
d'en avoir soin me rapportèrent que la tumeur ayant
été préparée par des cataplasmes maturatifs, parce
qu'on l'avoit crue scrophuleuse, fut ouverte ce jour
là d'un coup de lancette, qu'il en sortit beaucoup de
sang caillé, et qu'ensuite le sang arteriel sortant
abondamment, on mit dans cette ouverture,
seulement au dessous des tegumens, un bouton de
vitriol pour l'arrêter.

Je trouvay ce pauvre petit malade fort foible,
son bras tendu de la main jusqu'à l'épaule, enflammé
de rougeur, equimoté, et la tumeur plus étendue; mais
l'hémorragie parvinant fixée, je ne touchay point
à la playe, je fus seulement d'avis de mettre le
tourniquet d'avis de M. Petit en usage, suivant le
besoin parce qu'il ne comprime qu'à l'origine
de l'artère, Je restay auprès de luy jusqu'au
lendemain pour l'observer en attendant d'autres
indication. et il sembloit que son mal n'avoit pas
augmenté; mais l'après midi la perte de sang
ayant recommencé, on se servit du tourniquet
ordinaire, et je fus encore averti pour aller
faire l'amputation, y étant arrivé sur les huit
heures du soir, avec tout ce qui m'étoit nécessaire
pour cela, Je trouvay le malade beaucoup plus
épuisé, avec la fièvre, et une disposition à la
mortification, car la playe étoit noire, infecte avec

quelques Fictaines sur la tumeur qui augmentoit
à vue d'oeil, parce que n'ayant pas appliqué l'astringent
jusqu'à l'ouverture de l'artère, il n'empêchoit pas
le sang d'en sortir peu à peu au tour d'un tempou
de sang grumelé qui s'y forme ordinairement en
pareil cas (lorsque le Tourniquet ne comprimoit
pas assez, ce Vaineau au dedans) et ne pouvant
passer au dehors, il se panchoit dans le vuide de
la tumeur, dans l'interstice des muscles infiltroit
et yorgeroit tellement toute cette partie qu'on n'y
sentoit ^{presque} point de pouls; à ce funeste aspect les
chirurgiens me proposerent encore l'amputation,
mais comme ce desordre dependoit d'une cause
extérieure, quoy que le sujet fut Cacoéchime, Je
crus qu'on ne risqueroit rien de tenter de se rendre
maître du sang, et des autres symptômes par
l'opération de l'aneurisme, et les autres remèdes
convenables à la conservation d'un membre si
utile; d'ailleurs toute la partie étant menacée
d'une mortification prochaine, il convenoit
auparavant de la dégorgier pour prévenir la
continuation de cet accident au dedans de
l'endroit qu'on auroit cerné, et Enfin si les moyens
proposés pour conserver la partie ne venent pas
à bout, on auroit été à temps de l'emporter pour
taucher de luy sauver la vie, l'opération résolue
on luy administra le sacrement
Le Tourniquet de M. Serre appliqué à la partie



Supérieure du bras, le malade couché, et l'avant
bras assujéti, J'introduisis facilement le doigt
indicateur droit de haut en bas par l'ouverture qui
avoit été faite à la tumeur entre les tegumens,
et l'aponévrose du biceps dans un grand vuide,
et avec les ciseaux Je l'ouvris de 4. à 5. traverses
de doigt, ayant assés de jouë, Je passay aussy
la sonde de haut en bas par dessous l'aponévrose
dans un autre vuide, Je la coupay transversalement
en suivant la même direction pour les réunir, et me
conduire à la source de l'hémorragie, j'en sortis
plus d'une grande Ecuelle de sang grumelé, noir
et fétide, Je portay ensuite le doigt de bas en haut
obliquement dans ce vuide commun entre le rond
pronateur, et les supinateurs, au dela du pli de
l'avant bras jusqu'à la partie interne moyenne
inférieure du bras sur les vaineaux brachiaux,
le muscle brachial antérieur à côté du biceps sous
les tegumens, et dans ce trajet J'agrandis encore
cette incision de 5 à 6. traverses de doigt, en sorte
que cette playe avoit environ 6. pouces de longueur
sur trois et demy de profondeur, Je la débriay
dans toute son étendue avec le bistoury, et les
angles pour éviter de blesser des branches d'artere
Collaterales qui doivent servir dans cette occasion
à transporter le sang du tronc de l'artere aux
gronées branches inférieures, Jotay encore assés
de ce sang caillé du fond qui étoit attaché sur

le cordon des vaisseaux brachiaux que je vis alors
aisément, après quoy je relachay le tourniquet
pouv voir l'ouverture de l'artère qui estoit aussi
grande que celle qu'on pratique avec une grosse veine
dans la saignée, le sang en sortoit gros comme une
plume d'oie avec pulsation forcée qui le portoit
fort loin. Je reconnus qu'elle estoit au tronc de
l'artère brachiale 2. ou 3 lignes au dessus de sa
division en radiale, cubitale, et interosseuse par
le battement de ses branches, lors que pour un moment
je bouchois légèrement son ouverture avec le bout
du doigt, quand le tourniquet estoit encore relaché
et cela me fit faire attention à la maniere de
finir l'opération, le tourniquet étant reserré, je
viday tout le sang du fond de la playe, il n'en
sortit plus, quoique je ~~me tendis à le voir~~
~~revenir par l'ouverture de l'artère, au moyen~~
~~de l'anastomose des branches d'arteres collaterales~~
~~inferieures avec les superieures.~~ Je fis encore
tenir l'avant bras flechi pour relacher l'artère
brachiale, je mis une simple herine emoussée
(dont j'avois un peu redressé le crochet) dans la
playe de l'artère pour le lever, et l'assujettir,
tandis qu'avec un bistoury courbe, et un de chaumois
peu tranchant, je la detachay du nerf qui
l'accompagne environ trois lignes au dessus de son
ouverture, seulement pour le passage de l'aiguille
n'ayant point d'autres aiguilles alors que celles qui



serrent à l'amputation, j'en avois enfile une
d'un triple fil cizé dont les tranchants, et la
pointe étoit emouinée, mais comme je ne la pus
pas passer par dessous l'artère par sa tere, à
cause que son corps n'étoit pas assez courbé, je
la passay par sa pointe de bas en haut, par
dessous, et au dessus de l'ouverture de l'artère
pour la mieux embrasser dans ces endroits là,
l'ayant reçue au côté opposé avec le bout du doigt
gauche, je la conduisis obliquement, et
facilement, hors de la playe sans y faire aucune
lesion, le fil séparé, j'en fis deux ligatures,
une de ce pit que je placay sans la serrer à la
partie supérieure, et avec l'autre, je fis le nœud
du chirurgien à l'artère par dessous l'ouverture,
un autre nœuf, et une gance sur une petite
compresse qui ne couvroit point l'ouverture de
l'artère, afin de voir si le sang n'en sortiroit
plus, je relachay le tourniquet, et il n'en sortit
pas même une goutte de serosité, le sang ne
remontant point vers son principe, je ne fis
qu'une ligature dans la vue d'éviter la
longueur de l'opération, et les vaisseaux
collatéraux de communication pour en
conserver l'usage très utile à y rétablir la
circulation du sang (qu'on risque de détruire
en faisant de plus grandes divisions pour y
placer deux ligatures) afin de la faire plus

Surement, et avec succès, et rétabli par ce moyen
les fonctions d'une partie déjà destinée à être
retranchée; Je pompay le liquide qui renvoyoit
dans l'ouverture de l'artère pour éviter la
corruption par son séjour, et par précaution, Je
mis dessus cette petite plaie, un petit tampon de
charpy aplati, imbu d'eau spirituelle, exprimé,
couvert d'une petite compresse longue et sèche.
Depuis le dessus de la ligature jusqu'au principe
des artères inférieures qui paroissent découvertes,
et par dessus plusieurs autres graduées jusqu'au
dessus d'un niveau de la peau pour y former un
point d'appuy, en sorte qu'il n'y avoit que ces endroits
du tronc de l'artère qui souffrit une compression
pour y prévenir le retour du sang, résister à son
impulsion, et ainsi empêcher la distribution
dans l'avant bras, le fond et toute la
circonférence de la plaie fut pansé sans être
gêné avec des plumaceaux trempés dans de l'
espritueux à cause de la pourriture, le tout
couvert de son appareil, aussi imbu d'esprit de
vin, et du bandage propre peu serré pour ne pas
augmenter la tension; l'avant bras demi étendu
et la main relevée située sur un oreiller, je fis
mettre la main d'un chirurgien sur l'appareil
pendant la nuit, seulement à l'endroit de
l'élévation du gradué pour l'appuyer davantage
sur l'artère parce qu'il me paroisoit (à cause



de l'angorgement de toute la partie) qui n'y
avoit que cet endroit à pouvoir comprimer sans
y gêner la circulation; le malade eut quelque
sincopes pendant l'opération parce qu'elle fut assez
longue, et laborieuse; on lui donna un cordial.
et il fut mis à un régime convenable; Je ne trouvay
point de pouls à la radiale, ni à la cubitale à
l'endroit ordinaire, mais environ une heure après
l'opération, il y avoit si peu de mouvement à ses
arteres que j'aurois cru être celles de l'extrémité de
mes doigts; si ces petites pulsations presque im-
perceptibles n'auroient été unies, et assez réglées,
et il ne m'en fallut pas davantage pour m'assurer
encore plus que la blessure de l'artere étoit au tronc
de la brachiale au dessus de sa division comme
je l'avois remarqué, et que le sang commençoit
déjà à passer dans ses branches inférieures; la
main étoit tendue, mais assez molle, avec
une couleur, et une chaleur presque naturelle; le
lendemain matin 2. de l'opération le malade
avoit assez bien pansé la nuit, la playe
continuoit à dégorger beaucoup de sang
grumelé, sereux, et corrompu, la main, et toute
la partie se trouvoient un peu plus distendue,
et le pouls tant soit peu plus ouvert. le sang
recommencant à circuler dans l'avant bras
par les moyens auxiliaires dont j'ay parlé.
Je n'outay plus de ces sorts de heureux succès

qu'on pouvoit en attendre, mais cependant
je fus moins surpris de voir que ce membre
reprenoit son état par l'issue du sang épanché
et infiltré, que de la manière prompte dont la
circulation du sang se rétabliroit après avoir
fait la ligature au tronc de l'artère, parce qu'il
ne me paroissoit guère possible que les petites
extrémités d'artères collatérales anastomosées
qui se trouvoient dans cette occasion si utilement
placées pussent être suffisamment dilatées dans
si peu de temps, pour pouvoir porter assez de
sang dans cette partie pour sa nourriture, à
moins que quelques branches d'artères plus
considérables, prenant naissance de ce tronc au
dessus des premières, ne fussent venues àussy
se communiquer dans les branches inférieures,
ou se distribuer elles même dans l'avant bras
comme je l'ay remarqué quelques fois par les
injections de l'artère brachiale: il fut pansé
le soir sans déranger le gradué, en animant
toujours la playe et la partie pour résister
à la pourriture, et disendre; on continua
ainny selon les indications.

§ 4. Les supurations qui étoient encore
fort creuses, et infectes continuèrent à sortir
plus abondamment, et diminuoient toujours
plus le membre, la playe se détachoit, mais
je fus obligé de changer le gradué à l'exception



de la premiere compresse qui appuyoit le
Tempon etiptique sur l'ouverture de l'artere,
nous convinmes avec ce chirurgien ordinaire
de panser toute la playe avec une decoction
vulnereuse deterensive, et animee, et ensuite
simplement suivant le cas observant de
diminuer peu a peu la compression de
l'artere, et de la continuer ainsi jusqu'à ce
que les compressees et les ligatures tomberent
d'elles mêmes, ce qui arriva le onze, le fond
de la playe etant rempli de bonne chair, on
pansa a plat, et le malade fut entièrement
guéri le 27. *de l'operation. f.*

à Marseille le 8. Xbre. 1738.

Bonmort



Obs. lue. etraportée par m. foubert
en may 1739

15.0.11

Ancienne. Laine par et. Bismarck
rep. par et. Foubert

